

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

(R)

Circonscription
PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 BORGIO -

☎ (95) 36.05.70



Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 71
du 18 Février 1986

:	Abonnements 1986	:
:	- Vigne : halte aux cochenilles	:
:	- Pêcher : cloque, fusicoccum et pucerons	:
:	- Cultures maraichères : soins à donner aux jeunes	:
:	plants de tomate, le desherbage des pommes de	:
:	terre, fraisiers, et laitues	:

Abonnements 1986

Malgré la faiblesse des effectifs, nous continuerons à assurer en 1986, une édition générale vigne, arbres fruitiers, cultures maraichères. Les tarifs sont de :

- 90 frs pour un abonnement individuel
- 70 frs pour des abonnements collectifs (plus de 10 abonnements.)

Vous trouverez un bulletin d'abonnement dans le prochain envoi.

VIGNE

*** **cochenilles de la vigne** : ce sont les cochenilles farineuses qui causent les plus gros dégâts. Pendant la végétation, on peut les observer sous les feuilles, puis dans les grappes. Les ceps deviennent noirs, couverts de fumagine. Cette cochenille est difficile à atteindre car elle hiverne sous les écorces des souches, des bois, et des grosses racines.

Vous pouvez utiliser les huiles jaunes : DYTROL 50, SEPPIC VERGER, SEPPIC VIGNE, VERALINE 3 FLUIDE, DINITROL 3, ELGETIVER ACTIVE, traitement d'hiver UMUPRO,

Dose : 2 à 3,5 l/hl. Effectuez un lessivage des ceps, certains acariens seront également touchés.

*** **esca, excoriose**, les traitements à base d'arsenite de soude réalisés sur le bois bien ressuyé, au moins deux semaines **après** la taille et deux semaines **avant** le débourrement.

ARBRES FRUITIERS

*** **cloque du pêcher** : la période sensible s'étend du stade B jusqu'à l'étalement des feuilles. Au stade B utilisez les produits suivants :

captafol	DIFOSAN ORTHODIFOLATAN
captane	Nb. spécialités
ferbame	FERBAMATE
thirame	Nb. spécialités
zirame	Nb. spécialités

*** **fusicoccum du pêcher** : se manifeste par des tâches brunâtres au niveau des bourgeons, puis un dessèchement de l'extrémité des rameaux et une exudation de gomme; après la taille :

- couper et brûler les rameaux atteints
- intervenir avec :

benomyl	BENLATE
carbendazine	Nb. spécialités
thiophanate -methyl	PELT 44

*** **pucerons verts du pêcher** : Si vous observez la présence de jeunes femelles fondatrices au niveau des bourgeons, intervenez dès le stade D avec

cypermethrine	NS
deltamethrine	DECIS
fenvarelate	SUMICIDIN SUMICOMBI
parathion	Nb. spécialités

lindane (NS) associé à une huile blanche.

CULTURES MARAICHÈRES

---> Nettoyez les abords, et l'intérieur des serres avant la culture, Utilisez du terreau désinfecté en pépinières (produits utilisables : DAZOMET, METAM SODIUM, BROMURE de méthyle, et vapeur d'eau) ou traité avec un fongicide (PREVICUR)

---> Surveillez l'apparition de pucerons, aleurodes ... vecteurs de virus avec des plaques jaunes engluées disposées à proximité des ouvertures de la serre. Effectuez des traitements dès leur apparition.

---> En conditions humides, il est souhaitable de traiter **préventivement** contre les maladies.

:	:
:	:
:	:
:	:
:	:
:	:

- TOMATES

Protéger les jeunes plants avant la plantation avec des traitements fongicides à base de :

mancozébe	DITHANE N45	- tous les 8 - 10 jours
manébe	Nb. spécialités	

par temps couvert, ajouter du ROVRAL. On peut traiter au cuivre (200 grs matière active/ hl) juste avant la plantation, si on a observé des maladies bactériennes en 1985.

- POMMES DE TERRE

Le desherbage peut-être réalisé après le buttage et avant la levée des pommes de terre avec les produits commerciaux suivants :

AFALON S, QUINOTER	2 kg / ha en plein
PATORAN	3 à 4 kg/ha
SENCORAL	1 kg /ha
SOLAREX	1,6 kg /ha
FERVIN	1 kg/ha
FUSILADE	1 kg/ha
IGRATER 50	4 kg/ha

- FRAISIERS

---> Si les fraisiers sont **sous abri**, ils sont au stade E.F. (début à pleine floraison)

*** Aérer les tunnels dès que les premières fleurs sont visibles.

*** Sachez que l'irrigation localisée en goutte à goutte diminue les risques de botrytis. N'apportez pas d'engrais azoté après la floraison

*** Vous pouvez effectuer un traitement contre le botrytis avec :

vinchlozoline	RONILAN	1,5 kg/ ha
iprodione	ROVRAL	1,5 kg/ ha
procymidone	SUMISCLEX	1,5 kg/ha
dichlofluanide	EUPARENE	2 kg/ha
carbendazine	BAVISTINE	0,8 kg/ha
benomyl	BENLATE	0,8 kg/ha
methylthiophanate	PELT	1 kg/ha

Dés la floraison, surveillez la présence de pucerons ou d'araignées jaunes (aspect jaune gris du feuillage) Utilisez . contre les pucerons :

phosalone	ZOLONE AZOPHENE
pirimicarbe	PIRIMOR

. contre les araignées

dicofol	KELTHANE, KELTHION, CARBAX, SOVIFOL
cyhexatin	PLICTRAN, MITACID
chinomethionate	MORESTAN (également anti-oïdium)

o--> Si les fraisiers sont en **plein champ**, le stade B (départ en végétation) n'est pas encore atteint.

*** Effectuer une protection cuprique à 2 % avant la couverture.

P35

*** Si vous avez déjà commencé en automne une lutte contre le déperissement du fraisier, avec de l'Aliette, complétez avec :

ACYLON	80 à 100 grs pour 1000 litres d'eau
ACYLON P	160 à 200 grs
ACYLON Super F	0,25 à 0,30 litres pour 10000 litres d'eau

Les pieds seront bien mouillés au coeur.

DESHERBAGE DU FRAISIER :

Utiliser : Sur plantation propre, (sans herbe dans les trous)

VENZAR	1kg /ha
TENORAN	4 à 5 kg/ha

Contre les graminées uniquement, vous pouvez employer :

FERVIN	1kg/ha + 2 litres huile SCHERING
FUSILADE	2 à 3 l/ha + 1 litre d'AGRAL 90
DEVRIOL	4 kg à 6 kg/ha en plein champ sur chiendent

LAITUES

Les maladies qui se développent très facilement en serre peuvent être combattues en aérant les serres, en éliminant les plants qui coulent, en arrosant par temps sec et ensoleillé et en éliminant les mauvaises herbes

---> contre le mildiou, intervenir dès la levée avec du zinébe puis du mancozèbe tous les 8 jours.

Réservez FULVAX, REMILTINE, RHODAX, pour des attaques sérieuses.

---> contre le botrytis , sclérotinia

Saupoudrez de thirame en pépinière ou pulvériser deux fois du ROVRAL en plantation, préférez le ROVRAL

----- 00000000000 -----

(C) SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1986 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.